

Rekvirent

HER-id

Legenavn

Legekontor/Enhet

Adresse

Postnr. Poststed

Kopi av svar ønskes sendt til

Legenavn HER-id

Legekontor/Enhet

Postnr. Poststed

REKVIRERING**PRØVETAKING, se baksiden** Kontroll i første trimester.

Tas av alle gravide, ABO, RhD-typing og antistoffscreening.

1 x 4 ml serumrør med gel, centrifugert og 1 x 6 ml EDTA-rør.

 Kontroll av blodtypeantistoff i svangerskapsuke

1 x 6 ml EDTA-rør.

Prøvetakers signatur Tilleggsrekvisering ønskes ikke

Termin

Antall tidligere
fødsler og aborter**FØTAL GENOMISK RHD-TYPING OG BLODTYPEANTISTOFFSCREENING**

Kontroll i uke 24 (kun for RhD negative gravide).

Uåpnet prøverør sendes samme dag til St. Olavs hospital HF; Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Bruk deres rekvisjon. 2 x 6 ml EDTA.

BLODTYPESEROLOGI

Behandlet med anti-D-gammaglobulin (Rh-profylakse) siste 6-8 mnd?

Nei Ja Når:

Blodtransfusjon?

Nei Ja Når:

Erytroblastose hos barn?

Nei Ja Når:

Er blodtypeantistoff påvist tidligere?

Nei Ja

Hvis ja – Når:

Hvor:

Hvilke:

INFEKSJONSSEROLOGI

Første prøve i hvert svangerskap undersøkes for HIV, Syfilis, Hepatitt B sAg, Hepatitt B cAs.

Er det indikasjon for Hepatitt C-undersøkelse* av den gravide?

Ja Nei

Er det indikasjon for Rubella IgG** undersøkelse av den gravide?

Ja Nei

Er det indikasjon for Toxoplasmose-undersøkelse*** av den gravide?

Ja Nei

* Indikasjon HCV: Pasienten er eller har vært i risikomiljø for HCV-smitte.

**Indikasjon Rubella: kvinner som ikke er MMR-vaksinert eller har usikker vaksinasjonsstatus bør testes.

(Kvinner som har dokumentasjon på kun én dose anbefales en dose til etter svangerskapet, uten testing.)

***Indikasjon Toxoplasmose: Eksponering for kjente risikofaktorer (kontakt med katter eller katteavføring, konsum av kjøtt eller kjøttvarer som ikke er fullstendig gjennomstekt eller gjennomkokt), planlagt eller nylig gjennomført utenlandsreise til land utenfor Nord-Europa.

ANDRE OPPLYSNINGER

NB!**DETTE ER EN REKVISISJON FOR SCANNING,
DEN MÅ BARE FOLDES I PERFORERT BRETEKANT.****SVANGERSKAPSKONTROLLER:**

Det skal sendes prøve av alle gravide i tidsperioden første trimester. I første prøve blir det utført ABO, Rh(D)-typing og screening for irregulære blodtypeantistoff. Det blir også undersøkt på infeksjonsimmunologi (se framsiden).

TILLEGGSREKVIRERING VED POSITIV ANTISTOFFSCREENING PÅ IRREGULÆRE BLODTYPEANTISTOFF:

Ved positiv antistoffscreening på irregulære blodtypeantistoff, tilleggsrekvirerer laboratoriet de analysene som kreves for å identifisere antistoffet og evt. finne dets styrke. Ved spesielle funn kan det bli aktuelt å videresende prøven til andre laboratorier for videre utredning. Rekvirenten vil få melding om dette i en midlertidig svarrapport.

AKKREDITERING:

Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund og Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Helse Møre og Romsdal, er akkreditert i henhold til kravene gitt i NS-EN ISO 15189.

Dette gjelder prøvetaking, preanalytisk prøvebehandling, tapping av blodgivere og alle analyser angitt i våre akkrediteringsdokumenter (se våre nettsider/analysehåndbøker).

PRENATAL BEHANDLING MED ANTI-D PROFYLAKSE:

I henhold til nasjonale anbefalinger for prenatal behandling med anti-D profylakse, skal det tas blodprøve til føetal genomisk RhD-typing og blodtypeantistoffscreening av alle RhD negative gravide i svangerskapsuke 24 (2 x 6 ml EDTA). (Sendes St. Olavs hospital HF, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Bruk deres rekvisjon.) Dersom fosterets RhD type er positiv, skal moren tilbys RhD profylakse i svangerskapsuke 28 og etter fødselen, dersom immunt anti-D ikke er påvist.

TIL REKVIRENTEN:

Bruk av denne blanketten sees på som en "kontraktsinngåelse" med laboratoriet. For mer informasjon om rekvirering av tjenester, se laboratoriets handbok.

IDENTIFISERING AV PASIENT OG REKVIRENT:

Skriv pasientens fulle navn og fødselsnummer (11 siffer).

Fyll ut HER-id for lege eller HER-id for kommunal enhet, navn og arbeidssted.

REKVIRERING: Kryss av innenfor boksene, helst med blå/svart farge. Kulepenn eller en god blyant kan også brukes. Ikke bruk rød farge!

Ikke alle analyser er tatt med på rekvisjonen. Du rekvirerer andre analyser under «Andre opplysninger» på nederste del av rekvisjonen. Dersom det kun rekvireres prøver Medisinsk mikrobiologi, skal det brukes ordinær rekvisjon til Medisinsk mikrobiologi.

TIL PRØVETAKER:

Du skriver pasientens fulle navn og fødselsnummer (11 siffer) på prøverøra.

Send inn:

- 1 rør EDTA-blod (6 ml).
- 1 rør serum prøve i første trimester og ved infeksjonsserologi (4 ml rør med gel - centrifugert).