

Ved oppstart av ny medisin skal du ta disse blodprøvene x 1 pr. måned i 3 måneder.
Deretter x 1 kvar 3. måned. Blodprøvene skal takast hos fastlegen. Blodprøvene skal ikkje
sendast til Revmatologisk poliklinikk. Fastlege mottek prøvesvara og vurderer dei.

Skjema for medikamentkontroll – DMARD

Revmatologisk poliklinikk – Ålesund sjukehus

Fødselsdato: _____ Navn: _____

Medikament	Startdato	Medikament	Startdato
1.		3.	
2.		4.	

Dato	HB	Hvite	Diff	TRC	ALAT	Kreat	SR	CRP	BT

Blodprøvekontroller ved bruk av sykdomsmodifiserende medikamenter (DMARDs):

Blodprøver	Forklaring	Normalverdier/referanse
HB	Hemoglobin (blodprosent)	K: 11,7-15,3 M: 13,4-17,0
Hvite	Leukocytter (hvite blodlegemer)	4,1-9,8
Diff	Differensialtelling av leukocytter	
TRC	Trombocytter (blodplater)	164-370
ALAT	Enzym som særlig finnes i levercellene	K: 10-45 M: 10-70
Kreat	Kreatinin (nyrefunksjonsprøve)	K: 45-90 M: 60-105
SR	Senkningsreaksjon (stiger ved betennelsestilstander)	K 15-50 år: 1-21 K > 50 år: 1-28 M 15-50 år: 1-13 M > 50 år: 1-19
CRP	C-reaktivt protein (stiger ved infeksjoner og sykdomsaktivitet)	<5
BT	Blodtrykk	Ideelt < 140/90